

中国东北川续断科两个新变型

刘淑珍 曹 伟

(中国科学院沈阳应用生态研究所, 沈阳 110016)

摘 要 发表了东北产川续断科蓝盆花属两个新变型, 即白花窄叶蓝盆花 (*Scabiosa comosa* Fisch. ex Roem. et Schult. f. *albiflora* S. H. Li et S. Z. Liu) 和白花华北蓝盆花 (*S. tschiliensis* Grun. f. *albiflora* S. H. Li et S. Z. Liu). 两个变型与原变型的主要区别为花为白色。

关键词 东北; 川续断科; 蓝盆花属; 新变型

Two new forma of Dipsacaceae from Northeast China

LU ShuZhen CAO Wei

(Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016)

Abstract Two new forma of *Scabiosa* L., *Scabiosa comosa* Fisch. ex Roem. et Schult. f. *albiflora* S. H. Li et S. Z. Liu and *S. tschiliensis* Grun. f. *albiflora* S. H. Li et S. Z. Liu are reported. Two new forma differ from previous forma in white flower.

Key words Northeast China; Dipsacaceae; *Scabiosa* L.; new forma

1 白花窄叶蓝盆花 新变型

Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. et Schult. f. *albiflora* S. H. Li et S. Z. Liu f. nov.

A typo differt statura humilior 25—40 cm alta floribus albis interdum leviter caesijs

Hab. in cacumine montis pratjs

Nemonggu (内蒙古), Chifengshi (赤峰市) Keshiketeng Qi (克什克腾旗), 31. VII 1973. Y. L. Yang (杨雅玲) 617 (Typus IFP)

本变型与原变型的区别为植株较矮, 高 25 ~ 40 cm, 花白色, 有时稍呈淡蓝色。

生于山顶草地。产于内蒙古, 赤峰市克什克腾旗。

2 白花华北蓝盆花 新变型

Scabiosa tschiliensis Grun. f. *albiflora* S. H. Li

et S. Z. Liu f. nov.

A typo differt floribus albis foliis basalibus brevioribus petalis 3—8 cm longis lamina 3—6 cm longis

Hab. in clivis pratjs siccjs

Jilinshe (吉林省) Hunchunshi (珲春市), Chunhua xiang (春化乡), 16. VIII 1958. C. S. Wang (王崇书) 2399 (Typus IFP). Ergunashi (额尔古纳市) Gunan alidegahe (古纳马力德嘎河), 13. VII 1951. C. Wang (王战) 1918

本变型与原变型的区别为花白色, 基生叶较短, 叶柄长 3 ~ 8 cm, 叶片长 3 ~ 6 cm。

生于山坡干草地。产于吉林省珲春市春化乡; 内蒙古呼伦贝尔市额尔古纳市古纳马力德嘎河。